

がん化学療法 レジメン 施行手順書

ID _____ レジメン名称: Trastuzumab単剤q3week(維持6mg/kg)【乳がん】
 氏名 _____ 対象疾患: 乳がん
 身長 _____
 体重(日付) _____ 1コースの間隔: 21日間
 体表面積 _____ 最大コース数: なし

注意事項

- # 投与予定日より1週間を超えた場合は、改めて初回投与量を行う。
ただし、1週間以内の遅れであれば維持量(6mg/kg)で問題ない。
- # 調製時、注射用水で溶解、生理食塩液で希釈する。
(ブドウ糖溶液と混合した場合、蛋白凝集が起こるため)。
- # 初回投与の忍容性が良好であれば2回目以降の投与時間は30分間まで短縮可。

Rp	順	投与方法	主/側管	商品名	投与量	投与時間	day1 ()	day2 ()	day3 ()	...	day21 ()	
1	1	div	主 1	トラスツズマブ注 注射用水 7.2mL/トラスツズマブ [®] 150mg 生理食塩液 250mL	6 mg/kg	90-30 min	○					
							前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	...	前日 Check印	
							当日 Check印	当日 Check印	当日 Check印	...	当日 Check印	