

# がん化学療法レジメン施行手順書

## 注意事項

- # Rp2のイリノテカンとRp3のレボホリナートは同時に施行する。
- # Rp5のフルオロウラシルは2.5mL/hr携帯型持続ポンプを使用する。

ID	レジメン名称:FOLFIRI(CPT-11+LV+5-FU)【大腸】
氏名	対象疾患:大腸癌
身長	
体重(日付)	1コースの間隔:14日
体表面積	最大コース数:効果が続く限り

Rp	順	投与方法	主/側管	商品名	投与量	投与量	投与時間	day1 ( )	day2 ( )	day3 ( )	...	day14 ( )	
		po		デキサメタゾン錠	8	mg/body	朝、昼食後		○	○			
1	1	civ	主 1	グラニセトロン注 デキサメタゾンリン酸エステルNa注 生理食塩液50mL	1 9.9	mg/body mg/body	15 min	○					
2	2	civ	主 2	イリノテカン注 5%糖液250mL	150	mg/m2	90 min	○					
3	2	civ	側 1	レボホリナート注 生理食塩液250mL	200	mg/m2	2 hr	○					
4	3	civ	主 3	フルオロウラシル注 生理食塩液50mL 20mL	400	mg/m2	5 min	○					
5	4	civ	主 4	フルオロウラシル注 生理食塩液100mL 1本 全量115mL	2400	mg/m2	46 hr	○	○				
								前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	...	前日 Check印	
								当日 Check印	当日 Check印	当日 Check印	...	当日 Check印	