

# がん化学療法レジメン施行手順書

ID \_\_\_\_\_ レジメン名称: FOLFIRI(CPT-11+LV+5-FU)+BV 【大腸】  
 氏名 \_\_\_\_\_ 対象疾患: 大腸癌  
 身長 \_\_\_\_\_  
 体重 (日付) \_\_\_\_\_ 1コースの間隔: 14日  
 体表面積 \_\_\_\_\_ 最大コース数: 効果が続く限り

## 注意事項

- # Rp3のイリノテカンとRp4のレボホリナートは同時に施行する。
- # Rp6のフルオロウラシルは2.5mL/hr携帯型持続ポンプを使用する。

Rp	順	投与方法	主/側管	商品名	投与量	投与時間	day1 ( )	day2 ( )	day3 ( )	...	day14 ( )	
		po		デキサメタゾン錠	8 mg/body	朝、昼食後		○	○			
1	1	civ	主 1	グラニセトン静注液シリンジ デキサメタゾンリン酸エステルNa注 生理食塩液50mL	1 mg/body 9.9 mg/body	15 min	○					
2	2	civ	主 2	ベバシズマブ点滴静注用 生理食塩液100mL	5 mg/kg	30-90 min	○					
3	3	civ	主 3	イリノテカン点滴静注 生理食塩液250mL	150 mg/m2	90 min	○					
4	3	civ	側 1	レボホリナート点滴静注 生理食塩液250mL	200 mg/m2	2 hr	○					
5	4	civ	主 4	フルオロウラシル注 生理食塩液50mL 20mL	400 mg/m2	5 min	○					
6	5	civ	主 5	フルオロウラシル注 生理食塩液100mL 1本 全量115mL	2400 mg/m2	46 hr	○	○				
							前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	...	前日 Check印	
							当日 Check印	当日 Check印	当日 Check印	...	当日 Check印	