

がん化学療法レジメン施行手順書

ID レジメン名称:FTD/TPI+BV【大腸癌】
 氏名 対象疾患:大腸癌
 身長
 体重 1コースの間隔:28日間
 体表面積 最大コース数:なし

注意事項

(注1) トリフルリジンとして…

- BSA < 1.07 : 35mg/回
- 1.07 ≦ BSA < 1.23 : 40mg/回
- 1.23 ≦ BSA < 1.38 : 45mg/回
- 1.38 ≦ BSA < 1.53 : 50mg/回
- 1.53 ≦ BSA < 1.69 : 55mg/回
- 1.69 ≦ BSA < 1.84 : 60mg/回
- 1.84 ≦ BSA < 1.99 : 65mg/回
- 1.99 ≦ BSA < 2.15 : 70mg/回
- 2.15 ≦ BSA : 75mg/回

ベバシズマブの投与速度は,忍容性あれば90⇒60⇒30minと短縮可。

Rp	順	投与方法	主/側管	薬剤名	投与量	投与時間	day1 ()	day2 ()	day3 ()	day4 ()	day5 ()	day6 ()	day7 ()	day8 ()	day9 ()	day10 ()	day11 ()	day12 ()	day13 ()	...	day15 ()	...	day28 ()
		po		トリフルリジン/チピラシル 配合錠	注1 mg/m ² /回	朝・夕食後		○	○	○	○	○			○	○	○	○	○				
1	1	div	主 1	ベバシズマブ点滴静注液 生食100mL	5 mg/kg	30 ~ 90 min	○														○		
							前日 Check 印	前日 Check 印
							当日 Check 印	当日 Check 印