

がん化学療法レジメン施行手順書

ID レジメン名称: R-CHOP(CPA+ADM+VCR+PSL)【NHL】
 氏名 対象疾患: NHL
 身長
 体重 1コースの間隔: 21日間
 体表面積 最大コース数: 8コース

注意事項

※1 初回: q30minで50⇒100⇒150⇒200⇒250⇒300⇒350⇒400mL/hr
 2回目以降: q30minで100⇒200⇒300⇒400mL/hr

(注1) R投与量

•BSA ≤ 1.33 : 500mg •BSA 1.34-1.6 : 600mg
 •BSA 1.61-1.86 : 700mg •BSA ≥ 1.87 : 800mg

(注2) VCR; Max 2mg/body

Rp	順	投与方法	主/側管	薬剤名	投与量	投与時間	day1 ()	day2 ()	day3 ()	day4 ()	day5 ()	...	day21 ()
		po		d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg アセトアミノフェン錠200mg アプレピタントカプセル125mg	1 錠 2 錠 1 Cap	リツキシマブ 投与30分前に服用	○						
		po		プレドニゾロン錠	40-60 mg/m ²	1日1回 朝食後	○	○	○	○	○		
1	1	iv	主 1	ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注 生理食塩液20mL	100 mg/body	-	○						
2	2	div	主 1	リツキシマブ 生理食塩液500mL	375 (注1) mg/m ²	※1 min	○						
3	3	div	主 1	パロノセトロン点滴静注バック 0.75mg/50mL	0.75 mg	15 min	○						
4	4	div	主 1	ドキシソルビシン 生理食塩液50mL	50 mg/m ²	10 min	○						
5	5	div	主 1	ビンクリスチン 生理食塩液50mL	1.4 (注2) mg/m ²	10 min	○						
6	6	div	主 1	シクロホスファミド 生理食塩液500mL	750 mg/m ²	120 min	○						
		po		アプレピタントカプセル80mg	1 Cap	1日1回 朝食後		○	○				
							前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	...	前日 Check印
							当日 Check印	当日 Check印	当日 Check印	前日 Check印	前日 Check印	...	当日 Check印